



ワクチン	種類	乳児期						幼児期						学童期/青春期										
		生直後	6週	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9-11か月	12-15か月	16-17か月	18-23か月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳以上	
インフルエンザ菌b型(ヒブ)	不活化		①	②	③					④(注1)														
肺炎球菌(PCV13)	不活化		①	②	③					④														
B型肝炎	ユニバーサル		①	②				③																
	母子感染予防	①	②																					
ロタウイルス	1価		①	②				(注4)																
	5価		①	②	③			(注5)																
4種混合(DPT-IPV)	不活化		①	②			③		④(注6)															
3種混合(DPT)	不活化		①	②			③		④(注6)															
2種混合(DT)	不活化																							
ポリオ(IPV)	不活化		①	②			③		④(注6)															
BCG	生							①																
麻疹・風疹混合(MR)	生								①															
水痘	生								①			②												
おたふくかぜ	生								①			②												
日本脳炎	不活化																							
インフルエンザ	不活化																							
ヒトパピローマウイルス(HPV)	不活化																							

定期接種の推奨期間
 定期接種の接種可能な期間
 任意接種の推奨期間
 任意接種の接種可能な期間
 添付文書には記載されていないが小児科学会として推奨する期間
 健康保険での接種時期